

Wymogi bioasekuracji w gospodarstwie utrzymującym przeżuwacze

1. Wydzielenie w gospodarstwie strefy produkcyjnej, gdzie utrzymywane są zwierzęta i zabezpieczenie jej.
2. Przygotowanie, wyłożenie i utrzymywanie mat dezynfekcyjnych przy wjeździe (wjazdach) do strefy produkcyjnej oraz przy wejściach do budynków, w których utrzymywane są zwierzęta.
3. Prowadzenie rejestracji wejść osób i wjazdu pojazdów do części produkcyjnej gospodarstwa.
4. Wyposażenie gospodarstwa w sprzęt do prowadzenia doraźnej dezynfekcji w ilości i rodzaju dostosowanego do wielkości gospodarstwa.
5. Wyposażenie gospodarstwa w środki dezynfekcyjne o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwwirusowym w ilości wystarczającej na minimum 7 dni normalnej dezynfekcji. Środkami inaktywującymi wirus pryszczycy są:
 - wodorotlenek sodu (2%)
 - węglan sodu (4%)
 - kwas cytrynowy (0,2%)
 - kwas octowy (2%)
 - podchloryn sodu (3%)
 - peroksymonosiarczan potasu/chlorek sodu (1%)
 - dwutlenek chloru
6. Posiadanie w gospodarstwie miejsca do izolacji (kwarantanny) zwierząt oddzielonego litymi ścianami od miejsc, gdzie utrzymywane są zwierzęta, wyposażonymi w maty do dezynfekcji i utrzymywanie w tym pomieszczeniu każdego zwierzęcia wprowadzanego do stada przez minimum 14 dni.
7. Zabezpieczenie pasz i materiałów paszowych przed dostępem dzikich zwierząt oraz ptaków i gryzoni.
8. Używanie do karmienia zwierząt pasz wykonanych z materiałów składowanych w gospodarstwie przez minimum 14 dni (nie dotyczy zielonek).
9. Wyposażenie gospodarstwa w obuwie i odzież używaną wyłącznie do pracy w części produkcyjnej gospodarstwa i używanie jej
10. Prowadzenie w gospodarstwie deratyzacji części produkcyjnej.
11. Zabezpieczenie zwierząt przebywających na pastwiskach przed kontaktem ze zwierzętami dzikimi.

12. Unikanie wpuszczania wszelkich pojazdów do strefy produkcyjnej, w szczególności odbierających uppz.
13. Bezwzględne wystrzeganie się zakupu zwierząt z miejsc o nieznanym statusie epizootycznym, po okazyjnych cenach.